

## NO. 082 Pleomorphic adenoma

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tumor cell origin : intercalated duct complex · 包含 intercalated duct cell 和 myoepithelial cell 。Tumor cell 會聚集成各種不同形狀:island、duct、sheet、cord。</li> <li>➤ PA 大多為 well encapsulated 。</li> <li>➤ PA 的腫瘤構成有以下兩種細胞           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ductal cells : 形成單層管腔 (Fig. 2 red circle) · 且 ductal cell 的細胞質偏紅。管腔內有時可見 eosinophilic coagulation 。</li> <li>- Myoepithelial cell : myoepithelial cell 可以有各種變化包含 spindle, clear, plasmacytoid, basaloid, squamous, sebaceous 。在 PA 中 · 其 myoepithelial cells 會產生不正常增生 · 而使 myoepithelial cells 脫離 ductal cells · 往 stroma 處大量增生 。</li> </ul> </li> <li>➤ Plasmacytoid myoepithelial cell : 細胞質粉紅色 · 核偏一邊 (似 plasma cell ) · 也是 myoepithelial cell 的一種變形 。</li> <li>➤ Stroma 為 myxomatous tissue (偏藍) · 其構成較疏鬆 · 有 spindle-shape cell · 其也是 myoepithelial cell ; 有時可見 hyalinization 的區域 · 此區域看起來較紅、均質化 · 本片沒有明顯 hyalinization 的區域 。</li> <li>➤ Pseudocartilage area : 為 myxomatous tissue 出現 chondroid 或 cartilage 物質 (也可能會有 osteoid substance )</li> </ul>	<p>標記重點 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capsule (Fig. 1 yellow ↑ )</li> <li>2. Normal parotid gland (Fig. 1 blue ↑ )</li> <li>3. Ductal cells (Fig. 2&amp;3 red ↑ )</li> <li>4. Myoepithelial cells (Fig. 2&amp;3 yellow ↑ )</li> <li>5. Plasmacytoid myoepithelial cell (Fig. 4 yellow ↑ )</li> <li>6. Spindle myoepithelial cell (Fig. 2 green ↑ )</li> <li>7. Eosinophilic coagulation (Fig. 3 green ↑ )</li> <li>8. Myxomatous tissue (Fig. 2 blue ↑ )</li> <li>9. Pseudocartilage area (Fig. 5 blue ↑ )</li> </ol>
---	---

Fig.1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig.5

